郑州市 2025 年高中毕业年级第三次质量预测

数学 评分参考

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	A	D	A	D	D	C

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.

题号	9	10	11
答案	AC	BD	ABD

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共计 15 分.

12. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 或 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 13. $\frac{2}{3}$ 14. -1

四、解答题：本题共 5 小题，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.(13 分) 解：设服务器触发警报时其处于故障状态设为事件 A ，服务器未触发报警记时其处于故障状态记为 B .

(1) 由题意可知， $n(\Omega) = 500$ ； $n(A) = 475$ ，

由古典概型知识可知， $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{475}{500} = 0.95$ 4 分

(2) $\because P(A) = 0.95$ ， $\therefore P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.05$ ，

又 $n(B) = 50$ ， $\therefore P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{50}{500} = 0.1$

$\therefore P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0.9$ 6 分

方案甲：触发警报的服务器深度检修的经济损失的数学期望为：

$E_1 = 0.95 \times 6 + 0.05 \times 3 = 5.85$ （千元）.

未触发警报的服务器保持运行的经济损失的数学期望为：

$E_2 = 10 \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 1$ （千元）.

$\therefore E_{\text{甲}} = E_1 + E_2 = 6.85$ （千元）8 分

方案乙：触发警报的服务器快速诊断的经济损失的数学期望为：

$$E_3 = 0.95 \times 4 + 0.05 \times 1 = 3.85 \text{ (千元)} .$$

所以, $E_Z = E_2 + E_3 = 1 + 3.85 = 4.85 \text{ (千元)}$ 10分

方案丙: 未触发警报的服务器快速诊断的经济损失的数学期望为:

$$E_4 = 0.1 \times 4 + 0.9 \times 1 = 1.3 \text{ (千元)} ,$$

所以, $E_{丙} = E_1 + E_4 = 5.85 + 1.3 = 7.15 \text{ (千元)}$ 12分

$\therefore E_Z < E_{甲} < E_{丙}$, 所以应该选择方案乙.....13分

16. (15分) 解: (1) $f'(x) = e^x(ax - 1 + a)$,1分

$$\text{又 } x = -\frac{1}{2} \text{ 是函数 } f(x) \text{ 的极值点, 所以 } f'(-\frac{1}{2}) = e^{-\frac{1}{2}}(-\frac{1}{2}a - 1 + a) = e^{-\frac{1}{2}}(\frac{1}{2}a - 1) = 0,$$

$$\text{即 } a = 2. \text{5分}$$

$$\text{此时 } f'(x) = e^x(2x + 1),$$

$$f'(x) = e^x(2x + 1) > 0, \quad x > -\frac{1}{2}; \quad f'(x) = e^x(2x + 1) < 0, \quad x < -\frac{1}{2},$$

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 上单调递减, 在区间 $(-\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增,

所以, $x = -\frac{1}{2}$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.....7分

(2) 由 (1) 可知 $g(x) = f(x) - m(x-1) = e^x(2x-1) - m(x-1)$ 有两个零点,

即方程 $g(x) = e^x(2x-1) - m(x-1) = 0$ 有两个解.

当 $x = 1$ 时, $g(1) = e \neq 0$,8分

$$\text{当 } x \neq 1 \text{ 时, } e^x(2x-1) = m(x-1), \text{ 即 } m = \frac{e^x(2x-1)}{x-1}.$$

设 $h(x) = \frac{e^x(2x-1)}{x-1}$, 函数 $g(x)$ 零点个数即为函数 $y = h(x)$ 的图象与直线 $y = m$ 的交点个数.

.....9分

$$h'(x) = \frac{e^x(2x^2 - 3x)}{(x-1)^2}, \quad x \neq 1,$$

$$h'(x) > 0, \quad x > \frac{3}{2} \text{ 或 } x < 0; \quad h'(x) < 0, \quad 0 < x < \frac{3}{2} \text{ 且 } x \neq 1.$$

所以函数 $h(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, \frac{3}{2})$ 上单调递减, 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 上单调递增.

.....12分

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 如图所示

$$h(0) = 1, \quad h\left(\frac{3}{2}\right) = 4e^{\frac{3}{2}},$$

函数 $y = h(x)$ 的图象与直线 $y = m$ 有两个交点, 即 $0 < m < 1$ 或 $m > 4e^{\frac{3}{2}}$,

即 $0 < m < 1$ 或 $m > 4e^{\frac{3}{2}}$ 时, 函数 $g(x) = f(x) - m(x-1)$ 有两个零点.....15分

17. (15分) 解: (1) 由题意可知, $a_{n+1} = -a_n + \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$,

可得 $a_{n+1} - \frac{1}{2^{n+1}} = -\left(a_n - \frac{1}{2^n}\right)$,3分

又 $a_1 - \frac{1}{2} = -1$, 故数列 $\left\{a_n - \frac{1}{2^n}\right\}$ 是以 -1 为首项, 以 -1 为公比的等比数列,

所以 $a_n = (-1)^n + \frac{1}{2^n}$ 6分

(2) 由 (1) 可得 $b_n = na_n = (-1)^n n + \frac{n}{2^n}$,7分

所以, $S_n = -1 + 2 - 3 + 4 - \dots + (-1)^n n + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n}{2^n}$,

当 n 为奇数时, $S_n = \frac{-1-n}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n}{2^n}$ (1),

$\frac{1}{2}S_n = \frac{-n-1}{4} + \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \dots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}$ (2),

由 (1)-(2) 得 $\frac{1}{2}S_n = \frac{-n-1}{4} + 1 - \frac{n+2}{2^{n+1}}$,

所以, $S_n = \frac{3-n}{2} - \frac{n+2}{2^n}$ 9分

所以, $-\lambda < \frac{3-n}{2} - \frac{2}{2^n} + \frac{n}{2}$,

所以, $\lambda > \frac{2}{2^n} - \frac{3}{2}$, 所以 $\lambda > \frac{2}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$,10分

当 n 为偶数时, $S_n = \frac{n}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n}{2^n}$, 同理求和可得, $S_n = \frac{n+4}{2} - \frac{n+2}{2^n}$,12分

所以, $\lambda < \frac{n+4}{2} - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n}{2^n} + \frac{n}{2} = 2 + n - \frac{1}{2^{n-1}}$,

故, $\lambda < \frac{7}{2}$ 14分

综上, $\lambda \in (-\frac{1}{2}, \frac{7}{2})$ 15分

18. (17分) 解: (1) 依题意得, 点 M 在抛物线上, 且 $|MF| = \frac{7}{4}$,

所以, $\frac{p}{2} + \frac{5}{4} = \frac{7}{4}$, 所以可得 $p = 1$,3分

所以, E 的方程为 $y^2 = 2x$4分

(2) 抛物线方程为 $y^2 = 2x$, 焦点坐标为 $F(\frac{1}{2}, 0)$,

设 $l_1: x = my + \frac{1}{2}, l_2: x = -\frac{1}{m}y + \frac{1}{2}$,5分

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3), Q(x_4, y_4)$,

(i) 由 $\begin{cases} y^2 = 2x, \\ x = my + \frac{1}{2}, \end{cases}$ 消去 x 得 $y^2 - 2my - 1 = 0$,

$\Delta = m^2 + 4 > 0, y_1 + y_2 = 2m, y_1y_2 = -1$,

所以, $S_1 = \frac{1}{2}|OF||y_1 - y_2| = \frac{1}{4}\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{1}{4}\sqrt{4m^2 + 4}$,7分

同理, $S_2 = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{4}{m^2} + 4}$ 8分

所以, $S_1S_2 = \frac{1}{4}\sqrt{(m^2 + 1)(\frac{1}{m^2} + 1)} = \frac{1}{4}\sqrt{m^2 + \frac{1}{m^2} + 2} \geq \frac{1}{2}$,

当且仅当 $m^2 = \frac{1}{m^2}$ 时等号成立,

故, S_1S_2 的最小值为 $\frac{1}{2}$10分

(ii) 不妨设 $m > 0$, 由题意可知 $l_{AP}: y - y_1 = \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3}(x - x_1)$,

又 $y_1^2 = 2x_1, y_3^2 = 2x_3$, 所以, AP 的直线方程可化为: $y - y_1 = \frac{2}{y_1 + y_3}(x - x_1)$,

又 $x_C = \frac{1}{2}$, 故可得 $y_C = \frac{1 + y_1y_3}{y_1 + y_3}$,

又 $y_1y_2 = y_3y_4 = -1$, 所以可得 $y_D = -\frac{1 + y_1y_3}{y_1 + y_3}$,

可得 $y_C + y_D = 0$ ，所以可得 CD 的中点恒为 F ，.....13 分

以 CD 为直径的圆与 y 轴相切等价于 $y_C = \frac{1}{2}$ ，

若 $y_C = \frac{1}{2}$ ，则 $\frac{1}{2} = \frac{1 + y_1 y_3}{y_1 + y_3}$ ，所以， $2y_1 y_3 + 2 = y_1 + y_3$ ，

又 $l_1 \perp l_2$ ，所以 $\frac{2}{y_1 + y_2} \cdot \frac{2}{y_3 + y_4} = -1$ ，故 $(y_1 - \frac{1}{y_1})(y_3 - \frac{1}{y_3}) = -4$ ，

整理可得 $(y_1 y_3)^2 - (y_1^2 + y_3^2) + 1 = -4y_1 y_3$ ，

即 $(y_1 y_3 + 1)^2 = (y_1 - y_3)^2$ ，所以， $y_1 y_3 + 1 = y_1 - y_3$ 。

又 $2y_1 y_3 + 2 = y_1 + y_3$ ，故可得 $y_1 = 3y_3$ 。.....15 分

代入方程 $y_1 y_3 + 1 = y_1 - y_3$ 可得， $3y_3^2 - 2y_3 + 1 = 0$ ，

又， $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$ ，

故不存在以 CD 为直径的圆与 y 轴相切.....17 分

19. (17 分)

解：(1) 根据题意，平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, -1, -1)$ ，.....1 分

在平面 $x - y - z - 4 = 0$ 上任取点 $M(4, 0, 0)$ ，可得 $\vec{OM} = (4, 0, 0)$ ，

设原点 O 到平面 $x - y - z - 4 = 0$ 的距离为 d ，则 $d = \frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{n}_1|} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，

故原点 O 到平面 $x - y - z - 4 = 0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$4 分

(2) 由点到直线的距离公式 $d = \frac{|A'x_0 + B'y_0 + D'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$ ，

类比：点平面的距离公式为 $d = \frac{|A'x_0 + B'y_0 + C'z_0 + D'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}$ ，.....6 分

证明如下：

不妨设 $C \neq 0$ ，在平面 $A'x + B'y + C'z + D' = 0$ 内取一点 $Q(0, 0, -\frac{D'}{C'})$ ，

则向量 $\vec{QP} = (x_0, y_0, z_0 + \frac{D'}{C'})$ ，

取平面 $A'x + B'y + C'z + D' = 0$ 的一个法向量 $\vec{n} = (A', B', C')$ ，

所以点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $A'x + B'y + C'z + D' = 0$ 的距离为:

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|A'x_0 + B'y_0 + C'z_0 + D'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}} \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

(3) $\overrightarrow{EF} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{FG} = (1, 1, -1)$

设 $\vec{p} = (i, j, r)$ 为平面 ADD_1A_1 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{EF} \cdot \vec{p} = i + j + r = 0, \\ \overrightarrow{EG} \cdot \vec{p} = i + j - r = 0, \end{cases}$ 令 $i = 1$, 得 $j = -1$, $r = 0$

所以 $\vec{p} = (1, -1, 0)$. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

因为平面 CDD_1C_1 的方程为 $x - 2y + z - 2 = 0$, 所以由 (2) 知平面 CDD_1C_1 的一个法向量为

$\vec{q} = (1, -2, 1)$, $\dots\dots\dots 11 \text{ 分}$

设直线 DD_1 的一个方向向量为 $\vec{t} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \vec{t} \cdot \vec{p} = x_1 - y_1 = 0, \\ \vec{t} \cdot \vec{q} = x_1 - 2y_1 + z_1 = 0. \end{cases}$

令 $x_1 = 1$, 得 $y_1 = 1$, $z_1 = 1$ 所以 $\vec{t} = (1, 1, 1)$. $\dots\dots\dots 13 \text{ 分}$

因为 $DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 , 所以平面 ACC_1A_1 的一个法向量 $\vec{s} = (k, -t, -2)$ 与直线 DD_1 的方向向

量 $\vec{t} = (1, 1, 1)$ 垂直, 所以 $\vec{s} \cdot \vec{t} = k - t - 2 = 0$, $\dots\dots\dots 14 \text{ 分}$

所以平面 CDD_1C_1 与平面 ACC_1A_1 夹角的余弦值为

$$\begin{aligned} \frac{|\vec{q} \cdot \vec{s}|}{|\vec{q}| |\vec{s}|} &= \frac{|k + 2t - 2|}{\sqrt{k^2 + t^2 + 4}\sqrt{6}} = \frac{|3t|}{\sqrt{2t^2 + 4t + 8}\sqrt{6}} \\ &= \frac{3t}{2\sqrt{3}\sqrt{t^2 + 2t + 4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{t^2}{t^2 + 2t + 4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{1}{1 + 2\frac{1}{t} + 4\frac{1}{t^2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{1}{4\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{4}}} \end{aligned}$$

又 $1 \rightarrow \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{t}$, $\frac{|\vec{q} \cdot \vec{s}|}{|\vec{q}| |\vec{s}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{1}{4\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{4}}} \rightarrow \frac{1}{2}$

平面 CDD_1C_1 与平面 ACC_1A_1 夹角的余弦值的最大值为 $\frac{1}{2}$. $\dots\dots\dots 17 \text{ 分}$